

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED
---------------------------------------

## FOLHETO INFORMATIVO

### **Antibiophilus, 250 mg, Cápsulas**

Lactobacillus casei variedade rhamnosus

**Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.**

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar Antibiophilus Cápsulas com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter a necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

### **Neste folheto:**

- 1) O que é o Antibiophilus<sup>®</sup> Cápsulas e para que é utilizado.
- 2) Antes de tomar Antibiophilus<sup>®</sup> Cápsulas.
- 3) Como tomar Antibiophilus<sup>®</sup> Cápsulas.
- 4) Efeitos secundários possíveis.
- 5) Conservação de Antibiophilus<sup>®</sup> Cápsulas.
- 6) Outras informações.

**A substância activa** é Lactobacillus casei variedade rhamnosus titulada no mínimo a  $8.10^8$  germes/g, cada cápsula contém 250 mg.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED
---------------------------------------

**Os outros ingredientes** são: Amido de batata, Lactose, tiosulfato de sódio e glutamato de sódio.

**O Titular da Autorização de Introdução no Mercado do Antibiohilus® Cápsulas** são os Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.  
Estrada Nacional 117-2 2724-503 Amadora.

## 1. O QUE É ANTIBIOPHILUS® CÁPSULAS E PARA QUE É UTILIZADO

**Código ATC:** A07FA 01 Microorganismos Antidiarreicos - Organismos produtores de ácido láctico

**C.F.T.:** VII -6 a) Anti-sépticos intestinais.

Antibiohilus® Cápsulas é um medicamento anti-diarreico, de origem microbiana.

Antibiohilus® Cápsulas é utilizado na prevenção das diarreias induzidas por antibióticos e no tratamento sintomático das diarreias de origem não orgânica.

## 2. ANTES DE TOMAR ANTIBIOPHILUS® CÁPSULAS

**Não tome Antibiohilus® Cápsulas:**

- **Se tiver alergia** à substância activa ou a qualquer um dos ingredientes da fórmula.
- **Em casos** de hipersensibilidade à lactose ou ao leite.

**Tome especial cuidado com Antibiohilus® Cápsulas:**

- **Se for um indivíduo imunocomprometido**, deve utilizar Antibiohilus cuidadosamente, pois a probabilidade de ocorrerem infecções oportunistas está aumentada ou de ocorrer grandes desequilíbrios no seu aparelho gastrointestinal.

Não há necessidade de ajuste posológico nas crianças, idosos e insuficientes renais

ou hepáticos.

### **Gravidez**

**Antibiophilus® Cápsulas** não é aconselhável durante a gravidez, salvo indicação médica contrária.

### **Aleitamento**

**Antibiophilus® Cápsulas** não é aconselhável durante o aleitamento, salvo indicação médica contrária.

### **Condução de veículos e utilização de máquinas:**

Até ao momento não se encontram descritos efeitos que afectem esta capacidade.

### **Informações importantes sobre alguns ingredientes de Antibiophilus® Cápsulas:**

Antibiophilus® Cápsulas contém lactose e sódio na sua composição. Avise o seu médico se sofre de intolerância à lactose.

### **Tomar Antibiophilus® Cápsulas com outros medicamentos:**

Até ao momento não são conhecidas interacções do Antibiophilus com outros medicamentos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

### **3. COMO TOMAR Antibiophilus® Cápsulas**

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que **Antibiophilus® Cápsulas** é demasiado forte ou demasiado fraco.

Não altere as doses nem a duração do tratamento a seguir indicados:

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED
---------------------------------------

A dose habitual de **Antibiophilus® Cápsulas** é:

Na profilaxia de diarreias induzidas por antibióticos: 2 cápsulas por dia.

Tratamento sintomático de diarreia de origem não orgânica: 4 a 8 cápsulas por dia.

ANTIBIOPHILUS deve ser administrado diariamente, podendo ser tomado com água, sumos e alimentos.

Complementar este tratamento com bebidas açucaradas e caldos salgados para compensar as perdas em líquido devidas á diarreia.

**Se tomar mais Antibiophilus® Cápsulas do que deveria:**

Os Lactobacillus são hospedeiros habituais do intestino do Homem e de diferentes espécies animais e não possuem nenhuma toxicidade, confirmada não só pelos múltiplos estudos clínicos, mas também pela farmacovigilância, não tendo sido referido até à data nenhum efeito indesejável desde a sua comercialização.

**Caso se tenha esquecido de tomar Antibiophilus® Cápsulas:**

Tome a cápsula logo que se lembrar ou então, deverá ser retomado na próxima toma. Não duplique as doses.

A duração média do tratamento com **Antibiophilus® Cápsulas**, na situação de prevenção das diarreias, dura até ao final do tratamento do antibiótico.

No caso de tratamento sintomático das diarreias pode ser utilizado até ao desaparecimento de sintomas.

#### **4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS**

O Lactobacillus casei variedade rhamnosus, pode produzir um aumento da flatulência intestinal (gases), no início da terapêutica. Normalmente este efeito diminui com a continuação do tratamento.

#### **5. CONSERVAÇÃO DE Antibiophilus® Cápsulas**

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED
---------------------------------------

Conservar o medicamento na sua embalagem de origem. Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Não tome **Antibiophilus® Cápsulas** após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.

## **6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da autorização de introdução no mercado.

**Se tiver quaisquer outras questões acerca dos seus medicamentos, coloque-as ao seu médico ou farmacêutico.**

Este folheto foi revisto pela última vez em **Setembro 2004**.