

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

BEBEGEL
gel rectal

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o Bebegel

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico>

Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Bebegel, com precaução para obter os devidos resultados.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde consulte o seu médico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico

Neste folheto:

- 1.O que é Bebegel, e para que é utilizado
- 2.Antes de utilizar Bebegel,
- 3.Como utilizar Bebegel,
- 4.Efeitos secundários possíveis
- 5.Como conservar Bebegel,
- 6.Outras informações

1.O QUE É BEBEGEL E PARA QUE É UTILIZADO

bebegel é um laxante utilizado para:

Obstipação.

Preparação do tubo digestivo para intervenções cirúrgicas e exames radiológicos do abdómen.

Situações em que seja necessário evitar esforços de defecção (hérnias).

Bebegel está também indicado nas grávidas e mães a amamentar para o tratamento da obstipação.

2.ANTES DE UTILIZAR BEBEGEL

Não utilize BEBEGEL

se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias activas ou a qualquer outro componente Os laxantes estão contra-indicados em casos de náuseas, vómitos e dor abdominal a não ser por aconselhamento médico. As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais do que duas

semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes. Se surgir hemorragia rectal ou ausência de dejeção após utilização do laxante deverá consultar o médico.

Tome especial cuidado com BEBEGEL,

Não utilizar Bebegel mais de 3 dias consecutivos, sem conselho médico.

Em caso de ingestão acidental de Bebegel, aconselha-se que seja provocada a emese e/ou lavagem gástrica, com acompanhamento médico. A ingestão de glicerina pode provocar cefaleias, alterações gástricas e diarreia.

Utilizar BEBEGEL, com outros medicamentos
Nenhumas.

Gravidez e aleitamento
Pode ser utilizado.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Nenhumas.

3.COMO UTILIZAR BEBEGEL

Lactentes (1 mês a 12 meses de idade): 1 cânula por dia. Não utilizar mais de 3 dias seguidos, neste grupo etário sem aconselhamento médico.

Crianças e adultos: 1 a 2 cânulas por dia.

Aplicar de preferência sempre à mesma hora para a normalização do intestino.

Retirar a tampa, apertar ligeiramente até sair o ar, introduzir a cânula no recto e apertar o conteúdo do tubo.

Antes de introduzir pode lubrificar a cânula com o próprio conteúdo do tubo.

Se utilizar mais BEBEGEL, do que deveria

Não foi observado nenhum caso de sobredosagem. No entanto, no caso de ingestão acidental de Bebegel, aconselha-se que seja provocado o vômito e/ou lavagem gástrica, com acompanhamento médico. A ingestão de glicerina pode provocar cefaleias, alterações gástricas e diarreia.

Caso se tenha esquecido de utilizar BEBEGEL,

Quando tal acontecer, deve recomeçar o tratamento logo que se lembrar e informar o seu médico do sucedido.

4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS

Pode sentir associado à utilização do produto, desconforto rectal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo (sensação constante de peso no recto e desejo de evacuar).

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5.COMO CONSERVAR BEBEGEL

Conservar a uma temperatura inferior a 30°C

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize bebegel após o prazo de validade impresso nas cânulas ou na embalagem exterior
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize bebegel se verificar sinais visíveis de deterioração

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6.OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de bebegel

As substâncias activas são gelatina: 54mg e glicerina: 3830 mg

O outro componente é água desmineralizada.

Qual o aspecto de bebegel e conteúdo da embalagem

Embalagem de 6 cânulas de 4,5 g

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

VIATRIS - FARMACÊUTICA, S.A.
Rua do Centro Cultural, nº 13 - 1749-066 Lisboa

Este folheto foi aprovado pela última vez em