

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Bronquial-OM, 50 mg/ml+ 8mg/ml, xarope
Bronquial-OM, 375mg + 60mg, cápsulas

Carbocisteína e Sobrerol

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Bronquial-OM com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o rereer.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 14 dias, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

- 1.O que é BRONQUIAL-OM e para que é utilizado
- 2.Antes de tomar BRONQUIAL-OM
- 3.Como tomar BRONQUIAL-OM
- 4.Efeitos secundários possíveis
- 5.Como conservar BRONQUIAL-OM
- 6.Outras informações

1.O QUE É BRONQUIAL-OM E PARA QUE É UTILIZADO

BRONQUIAL-OM é um auxiliar da fluidificação das secreções brônquicas durante o tratamento antibacteriano das infecções respiratórias.

2.ANTES DE TOMAR BRONQUIAL-OM

Não tome BRONQUIAL-OM

- se tem alergia (hipersensibilidade) às substância(s) activa(s) ou a qualquer outro componente de BRONQUIAL-OM.
- se sofre de úlcera péptica activa.

Tomar BRONQUIAL-OM com outros medicamentos

Informe o seu farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Tomar BRONQUIAL-OM com alimentos e bebidas

Não existem contra-indicações à utilização de BRONQUIAL-OM com alimentos e bebidas.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Informações importantes sobre alguns componentes de BRONQUIAL-OM

O xarope contém sacarose: se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento

Para-hidroxibenzoato de metilo: Pode causar reacções alérgicas (possivelmente retardadas)

e sódio: Este medicamento contém 7,28 mg/ml. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio

3.COMO TOMAR BRONQUIAL-OM

Fale com o seu farmacêutico se tiver dúvidas.

A utilização em crianças com menos de 5 anos deve ser feita apenas com indicação médica.

Xarope:

Crianças entre 5 e 10 anos: 1 colher - medida 2 vezes por dia

Adultos: 1 colher - medida 3 vezes por dia.

1 colher-medida corresponde a 10 ml

Cápsulas:

Crianças entre 5 e 10 anos: 1 cápsula 2 vezes por dia

Adultos: 1 cápsula 3-4 vezes por dia.

A duração máxima do tratamento deverá ser de 7 a 14 dias.

Se tomar mais BRONQUIAL-OM do que deveria

Fale com o seu farmacêutico ou consulte o seu médico. Poder-se-á praticar a lavagem gástrica e promover a peristálise intestinal.

Caso se tenha esquecido de tomar BRONQUIAL-OM

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu farmacêutico.

4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS

Como os demais medicamentos, BRONQUIAL-OM pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

O emprego de doses elevadas, superiores às aconselhadas, pode por vezes provocar aparecimento de perturbações no tubo digestivo, tais como: gastralgias, náuseas e diarreias. Nestes casos, a posologia deverá ser reduzida.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu farmacêutico.

5.COMO CONSERVAR BRONQUIAL-OM

Conservar na embalagem de origem.

Conservar a temperatura inferior a 25C°

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize BRONQUIAL-OM após o prazo de validade impresso na embalagem exteriora seguir a EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado..

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6.OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de BRONQUIAL-OM

As substâncias activas são a carbocisteína e o sobrerol

Os outros componentes são:

Xarope: Sacarose, Para-hidroxibenzoato de metilo, Fosfato dissódico, Hidróxido de sódio, Essência de cereja, Essência de framboesa, Água purificada.

Cápsulas: Hidroxipropilcelulose, Estearato de magnésio.

Qual o aspecto de BRONQUIAL-OM e conteúdo da embalagem

Xarope:

Frascos de vidro castanho com tampa de plástico contendo 200 ml de Bronquial-OM xarope. e uma colher-medida de 10 ml

Cápsulas:

Embalagem de 20 cápsulas em blíster PVC/alumínio.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular: OM Portuguesa, Laboratórios de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

APROVADO EM 18-07-2007 INFARMED

Rua da Indústria, nº2 , 2610-088 Amadora

tel: 21 470 85 00

fax: 21 470 85 06

e-mail: om.portuguesa@om-portuguesa.pt

Fabricante:

OM Portuguesa, Laboratórios de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

Rua da Indústria, nº2 -2ª- Quinta grande - , 2610-088 Amadora

Este folheto foi aprovado pela última vez em