

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Imogas 240 mg cápsulas moles
Simeticone

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar Imogas com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 10 dias, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Imogas e para que é utilizado
2. Antes de tomar Imogas
3. Como tomar Imogas
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Imogas
6. Outras informações

1. O QUE É IMOGAS E PARA QUE É UTILIZADO

Imogas é utilizado para o tratamento dos gases (flatulência), que fazem com que sintam o seu estômago distendido. Imogas actua diminuindo os gases retidos que provocam distensão abdominal.

2. ANTES DE TOMAR IMOGAS

Não tome Imogas

Não tome Imogas se tem alergia ao simeticone ou a qualquer outro componente da cápsula (ver secção 6).

Tome especial cuidado com Imogas

Deve consultar o seu médico se:

Os gases não melhorarem ao fim de 10 dias de tratamento.

Tiver prisão de ventre que não melhora.

Ao tomar Imogas com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento:

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento, incluindo o Imogas.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Imogas não tem efeitos conhecidos na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

3. COMO TOMAR IMOGAS

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Se tem mais de 15 anos de idade: Tome 1 cápsula no fim de cada refeição principal. Engula a cápsula com um copo de água cheio. Não tome as cápsulas por um período superior a 10 dias.

Não administrar Imogas a crianças com idade inferior a 15 anos.

Se tomar mais Imogas do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar IMOGAS

Tome uma cápsula após a próxima refeição principal. Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Imogas pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Efeitos secundários menores: Náuseas e prisão de ventre. Efeitos secundários raros: reacções alérgicas, tais como erupção cutânea, comichão, inchaço da face e língua ou dificuldade em respirar.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR IMOGAS

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não tome Imogas após o prazo de validade inscrito no blister ou na cartonagem. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Imogas:

- A substância activa é o simeticone. Cada cápsula mole contém 240 mg de simeticone.
- Os outros componentes são a gelatina e o glicerol.

Qual o aspecto de Imogas e conteúdo da embalagem:

Imogas é uma cápsula de gelatina mole transparente. Cada embalagem contém 10, 20 ou 30 cápsulas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Johnson & Johnson, Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso n.º 69 A – Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal
Tel.: 21 436 88 35

Fabricante:

Catalent France Beinheim, S.A.
74, Rue Principale
67930 Beinheim
França

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu (EEE) sob as seguintes denominações:

Dinamarca: IMOGAS

Finlândia: IMOGAS 240 mg pehmeä kapseli

Irlanda: IMOGAS 240 mg Soft Capsules

Luxemburgo: IMONOGAS

Espanha: IMONOGAS 240 mg, capsulas blandas

Suécia: IMOGAZE 240 mg mjuk kapsel

Noruega: IMOGAS kapsel, 240 mg

Bélgica: IMONOGAS

Islândia: IMOGAZE 240 mg mjúk hylki

Portugal: IMOGAS 240 mg cápsulas moles

Este folheto foi aprovado pela última vez em

Aconselhamento educacional de saúde

O que é que deve fazer se tiver problemas digestivos?

Indigestão:

Pode ter problemas de indigestão se:

- Comer demais;
- Comer alimentos muito pesados;
- Se comer muito depressa, sem mastigar;
- Beber demasiado álcool com a alimentação.

Tente evitar estas situações.

Gases (flautulência):

Alguns alimentos têm maior tendência para causar gases, porque:

- Contêm ar (por exemplo, bebidas gasosas, pão fresco)
- Contêm elevadas quantidades de hidratos de carbono, que não podem ser absorvidas (por exemplo, vegetais secos, couve, vegetais crus, cebolas)

Tente evitar este tipo de alimentos.

Se ainda tiver dúvidas pergunte ao seu médico ou farmacêutico.