

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

MEDALGINAN, 50 mg/g, gel Salicilato de dietilamina

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar MEDALGINAN Gel com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é MEDALGINAN Gel e para que é utilizado
2. Antes de utilizar MEDALGINAN Gel
3. Como utilizar MEDALGINAN Gel
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar MEDALGINAN Gel
6. Outras informações

1. O QUE É MEDALGINAN GEL E PARA QUE É UTILIZADO

MEDALGINAN Gel é um medicamento tópico, antiálgico e anti-inflamatório, eficaz, de fácil aplicação local, com escassos efeitos indesejáveis.

MEDALGINAN Gel tem um cheiro agradável, e uma consistência e aspecto cosmeticamente aceitáveis.

MEDALGINAN Gel está indicado nas seguintes situações:

Dores, espasmos e distensões musculares. Entorses. Lumbago. Situações médico-desportivas.

2. ANTES DE UTILIZAR MEDALGINAN GEL

Não utilize MEDALGINAN Gel

- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa ou a qualquer outro componente de MEDALGINAN Gel;
- em crianças com menos de 12 anos;
- nas mucosas, feridas, queimaduras ou dermatoses.

Tome especial cuidado com MEDALGINAN GEL

- Após utilização lavar bem as mãos para evitar qualquer contacto do produto com os olhos ou mucosas.

Ao utilizar MEDALGINAN GEL com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Tal como qualquer outro medicamento, apenas deve ser utilizado nestas situações particulares em caso de efectiva necessidade.

Informações importantes sobre alguns componentes de MEDALGINAN GEL

MEDALGINAN Gel contém para-hidroxibenzoato de metilo. Pode causar reacções alérgicas (possivelmente retardadas).

MEDALGINAN Gel contém propilenoglicol. Pode causar irritação cutânea.

3. COMO UTILIZAR MEDALGINAN GEL

Utilizar MEDALGINAN Gel sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Usar uma a três vezes ao dia, massajando suavemente na região dolorosa, tendo o cuidado de não tocar nos olhos ou outras zonas sensíveis sem lavar bem as mãos.

Não utilizar durante mais de 7 dias. Se a situação se mantiver consulte o seu médico.

Caso se tenha esquecido de utilizar MEDALGINAN GEL

Se se esqueceu de aplicar MEDALGINAN Gel na altura devida, aplique-o logo que possível e depois continue como normalmente. Não aplique uma quantidade a dobrar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, MEDALGINAN Gel pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

MEDALGINAN Gel possui uma certa acção rubefaciente, pelo que o aparecimento de calor e rubor fazem parte da sua actividade terapêutica.

Estão descritos efeitos cutâneos raros: *rash* (vermelhidão) e prurido (comichão) local.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR MEDALGINAN GEL

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize MEDALGINAN Gel após o prazo de validade impresso na embalagem exterior ou na bisnaga.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de MEDALGINAN GEL

- A substância activa é o salicilato de dietilamina. 1 g de gel contém 50 mg de salicilato de dietilamina.

- Os outros componentes são: nicotinato de benzilo, extracto fluido de capsicum, cânfora, para-hidroxibenzoato de metilo, etanol, carbómero 940, trolamina, propilenoglicol e água purificada.

Qual o aspecto de MEDALGINAN GEL e conteúdo da embalagem

O MEDALGINAN Gel está disponível em bisnagas de 40 g e 100 g.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

MEDINFAR CONSUMER HEALTH – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA.

Rua Henrique Paiva Couceiro, N° 27
Venda Nova, 2700-451 Amadora
Portugal

Fabricantes

Laboratório Medifar - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Henrique Paiva Couceiro, 29
2700-451 Amadora
Portugal

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Zona Industrial de Condeixa-a-Nova
3150-194 Condeixa-a-Nova
Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em: 03/2011