

PROJECTO DE FOLHETO INFORMATIVO

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar ILVICO N com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

Neste folheto:

1. O que é ILVICO N e para que é utilizado
2. Antes de tomar ILVICO N
3. Como tomar ILVICO N
4. Efeitos secundários possíveis
5. Conservação de ILVICO N

ILVICO N

Comprimidos revestidos

As substâncias activas são: paracetamol (250 mg), ascorbato de cálcio dihidrato (36 mg, equivalente a 30 mg de vitamina C), cafeína (10 mg) e hidrogenomaleato de bromofeniramina (3 mg).

Os outros ingredientes são: lactose, carboximetilcelulose sódica, celulose, aerosil 200, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose, dióxido de titânio, polietilenoglicol 4000, polietilenoglicol 6000 e talco.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

MERCK S.A.

Rua Alfredo da Silva, nº 3-C

1300-040 Lisboa

1. O QUE É ILVICO N E PARA QUE É UTILIZADO

Classificação farmaco – terapêutica

II-9 - analgésicos e antipiréticos.

ILVICO N está indicado no tratamento dos sintomas das constipações e gripes tais como febre, dor de cabeça, dores dos membros, processos catarrais e congestão nasal.

2. ANTES DE TOMAR ILVICO N

Não tome ILVICO N:

- se tem hipersensibilidade (alergia) às substâncias activas ou a qualquer outro ingrediente de ILVICO N;
- se tem insuficiência renal (problemas graves de rins) ou hepática (problemas graves de fígado);
- se tem deficiência hereditária de glucose-6-fosfato-dihidrogenase;
- se tem aumento da pressão intra-ocular (glaucoma agudo);

- se tem perturbações do ritmo cardíaco (taquicardia, arritmia).

Tome especial cuidado com ILVICO N:

- se tem problemas de rins ou de fígado, anemia, problemas pulmonares ou cardíacos deve evitar tratamentos prolongados.

- se tem hipertrofia da próstata (tomar ILVICO N apenas com recomendação e sob vigilância médica).

- não usar doses maiores que as recomendadas, nem durante mais de 3 dias ou em crianças com menos de 6 anos, a não ser por expressa indicação do médico.

Tomar ILVICO N com alimentos e bebidas:

Os comprimidos devem ser ingeridas inteiros, com um pouco de líquido e após as refeições.

ILVICO N pode potenciar os efeitos do álcool.

Gravidez

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

O paracetamol passa através da placenta. ILVICO N só deve ser administrado na gravidez quando os benefícios que se esperam do tratamento excedam nitidamente os riscos, e por expressa indicação do médico.

Aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

O paracetamol passa para o leite materno, em quantidades correspondentes ao nível da concentração desta substância no sangue da mãe. ILVICO N só deve ser administrado durante o aleitamento quando os benefícios que se esperam do tratamento excedam nitidamente os riscos, e por expressa indicação do médico.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Mesmo quando administrado de acordo com as instruções, ILVICO N pode alterar a capacidade de condução e de utilização de máquinas. Isto aplica-se em particular quando associado ao consumo de álcool.

Informações importantes sobre alguns ingredientes de ILVICO N:

Este medicamento contém lactose, pelo que, se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Tomar ILVICO N com outros medicamentos:

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

Existem medicamentos que, ao ser tomados simultaneamente com ILVICO N, podem provocar lesões no fígado, nomeadamente glutetemida, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina e salicilamida.

ILVICO N pode potenciar os efeitos dos sedativos e do álcool.

Outros medicamentos que podem alterar ou ser alterados pela acção de ILVICO N: propantelina, metoclopramida, cloranfenicol, varfarina, derivados cumarínicos, zidovudina, lítio, antidepressivos tricíclicos e inibidores da monoaminoxidase.

3. COMO TOMAR ILVICO N

Tome ILVICO N sempre de acordo com as instruções do médico ou do farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Salvo prescrição médica em contrário, os adultos devem tomar 2 comprimidos 3 vezes ao dia.

As crianças com mais de 6 anos devem tomar 1 comprimido 3-4 vezes ao dia.

Os comprimidos devem ser ingeridas inteiros, com um pouco de líquido e após as refeições.

Aviso: Este medicamento não é indicado em crianças com menos de 6 anos.

Se tomar mais ILVICO N do que deveria:

A sintomatologia por sobredosagem inclui tonturas, vômitos, anorexia e dores abdominais.

Caso tenha ingerido uma dose elevada (superior a 6 g em dose única) deve recorrer de imediato ao hospital mesmo que não tenha quaisquer sintomas, dado que estes, muito graves, podem aparecer ao fim de alguns dias.

O tratamento sintomático inclui:

Lavagem gástrica, administração oral de carvão activado e hemodiálise.

Caso se tenha esquecido de tomar ILVICO N:

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como os demais medicamentos, ILVICO N pode ter efeitos secundários.

Quando, e caso surjam, os primeiros sinais ou sintomas de hipersensibilidade, deve parar a toma do medicamento e contactar de imediato um médico.

Devido ao componente anti-histaminico, pode ocorrer sonolência, boca seca e em casos raros excitação.

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. CONSERVAÇÃO DE ILVICO N

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25° C. Para proteger da humidade.

Não utilize ILVICO N após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: Janeiro de 2005