

Folheto informativo

MELHORAL

20 Comprimidos

Via oral

Dores, Febre , Constipações e Gripe

O DEVE SABER SOBRE MELHORAL®

Por favor leia este folheto com atenção antes de tomar Melhoral®, especialmente a secção das precauções a ter. Este folheto fornece algumas informações acerca do seu medicamento. Se tiver alguma dúvida pergunte ao seu farmacêutico ou médico.

O que está dentro da caixa?

Melhoral® comprimidos,

Cada caixa contém 20 comprimidos, em dois blisters.

O que é Melhoral?

São comprimidos brancos redondos com duas faces, uma gravada com Melhoral e outra com uma ranhura para dividir o comprimido. Cada comprimido contém 500mg de ácido acetilsalicílico e 30mg de cafeína. Contém portanto salicilatos.

Os comprimidos também contêm amido de milho.

Quem produz o Melhoral®?

O detentor da autorização de introdução no mercado é a GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Produtos para a Saúde e Higiene, Lda., com sede na R. Dr. António Loureiro Borges n.º3, Aquiparque Miraflores, 1495-131 Algés. Todos os pedidos devem ser dirigidos a esta morada.

O fabricante é a Sanofi-Synthelabo Produtos Farmacêuticos SA*

Estrada de Manique, Tires – 2645-475 Alcabideche
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, Lda*
Av. das Indústrias – Alto do Colaride
2735-213 Cacém
Famar. S.A.*
Baranzate di Bollate(MI), Via Zambelletti Itália

*Conforme Adequado

Como actua Melhoral®?

MELHORAL tem por base o ácido acetilsalicílico, um dos analgésicos (alivia a dor) e antipiréticos (baixa a febre) mais utilizados em todo o mundo, devido à sua comprovada eficácia e na dor e febre e à sua segurança. Como complemento, o Melhoral contém ainda cafeína, que para além de ter uma acção estimulante, potencia a acção do ácido acetilsalicílico permitindo deste modo um alívio mais rápido e eficaz.

Em que casos se deve utilizar Melhoral®?

Melhoral é indicado para o alívio rápido e eficaz de dores, febre e dos sintomas associados a gripes e constipações de toda a família.

Antes de tomar Melhoral® verifique:

Quais os casos em que não deve utilizar Melhoral®?

Não deve tomar **Melhoral®**, a não ser por expressa indicação do médico, se:

- for alérgico ao ácido acetilsalicílico ou a outros salicilatos;
- tiver asma;
- tiver problemas de estômago persistentes ou recorrentes, úlceras ou hemorragias gástricas;
- estiver a tomar medicação para artrite, diabetes, gota e anticoagulantes;
- estiver grávida ou a pensar engravidar.

Deverá consultar o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Melhoral® se:

- se destinar a crianças ou adolescentes com febre;
- estiver a receber tratamento médico ou a tomar outros medicamentos;
- persistirem os sintomas ou surgirem novos, ou se surgir rubor ou inchaço, pois podem ser sinais de uma situação mais grave;

tiver uma dor de garganta aguda e esta persistir por mais de dois dias acompanhada de febre, dores de cabeça, náuseas ou vômitos.

Não deve tomar doses maiores que as recomendadas, nem durante mais de 3 dias, nem em crianças com menos de três meses.

Se estiver grávida ou a amamentar:

Tal como com todos os outros medicamentos, se está grávida ou a amamentar não deve tomar **Melhoral®** excepto se o seu médico lhe tiver prescrito este medicamento.

Como deve tomar Melhoral?

Adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos:

Tomar 1 a 2 comprimidos com água, 3 a 4 vezes ao dia, de preferência a seguir às refeições. Não tomar mais de 8 comprimidos num período de 24 horas, sem ser por recomendação do médico.

De preferência, tomar **Melhoral®** após refeição ligeira ou com leite, de modo a atenuar a ocorrência de azia, indisposição ou dor de estômago ligeira.

Este medicamento não deve ser usado para a medicação na dor por mais de 10 dias, excepto se prescrito pelo médico, uma vez que uma dor intensa e prolongada pode indicar uma doença (situação patológica) que requer a avaliação e tratamento médico.

Este medicamento não deve ser usado para:

- Medicação de febre alta (superior a 39,5°C);
- Febre de duração superior a 3 dias;
- Febre recorrente;

excepto se prescrito pelo médico, uma vez que estas situações podem ser indicativas de doença grave requerendo avaliação e tratamento médico.

Em caso de dúvida, é indispensável pedir o conselho do seu médico ou farmacêutico.

Deve limitar o uso de medicamentos, alimentação ou bebidas contendo cafeína (tais como: café, chá e certos refrigerantes) enquanto tomar este medicamento.

O que fazer em caso de sobredosagem?

Não deve tomar doses maiores que as recomendadas.

Em todos os casos de toma acidental de dosagem superior à recomendada procure assistência profissional ou contacte o **Centro de Informação Antivenenos (Tel.21-7950143/4/6)**.

Como procedimento de emergência recomenda-se em casos de intoxicações moderadas a ingestão abundante de líquidos e, em casos de intoxicações agudas, a lavagem gástrica.

Que efeitos indesejáveis pode ter Melhoral®?

Na maioria das pessoas **Melhoral®** não causará nenhum efeito indesejável. No entanto, como com todos os medicamentos, podem surgir ocasionalmente alguns efeitos secundários.

Em caso de sobredosagem com Melhoral poderá ocorrer diminuição da capacidade auditiva, zumbidos, dores de cabeça e tonturas.

No caso de ocorrer uma reacção de hipersensibilidade, o uso deste medicamento deve ser descontinuado.

Este medicamento não afecta a capacidade de condução de máquinas.

Caso surja algum efeito secundário não mencionado neste folheto deverá informar o seu médico ou farmacêutico.

Prazo de validade:

Não utilize este medicamento depois do fim do prazo de validade impresso no blister e na caixa.

Não utilize este medicamento caso o alumínio do blister esteja rasgado.

ATENÇÃO: Mantenha todos os medicamentos fora do alcance das crianças

Folheto Informativo revisto em Fevereiro de 2005

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.
R. Dr. António Loureiro Borges n.º3
Aquiparque Miraflores
1495-131 Algés